

Université d'Évry Val d'Essonne 2011-2012

M63 algèbre et géométrie

Feuille 3 — Dualité et orthogonalité

Exercice 1. Dans \mathbf{R}^3 , on considère les sous-espaces suivants.

$$F_1 = \{(x, y, z) \text{ tels que } z = 0\}$$

$$F_2 = \{(x, y, z) \text{ tels que } x + y = 2x - z = 0\}$$

$$F_3 = \text{Vect}\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}\right)$$

Donner une base de chacun d'entre eux ainsi que de leurs orthogonaux dans $(\mathbf{R}^3)^*$.

Exercice 2. Soient $\varphi_1, \dots, \varphi_p$ des formes linéaires sur un espace vectoriel E .

1. Montrer que $\text{Vect}(\varphi_1, \dots, \varphi_p)^o = \ker \varphi_1 \cap \dots \cap \ker \varphi_p$.
2. Soit $\psi \in E^*$. Dédire de la question précédente que $\psi \in \text{Vect}(\varphi_1, \dots, \varphi_p)$ si et seulement si $\ker \psi \supset \ker \varphi_1 \cap \dots \cap \ker \varphi_p$.

Exercice 3.

1. Soient E un espace vectoriel de dimension finie, et F_1 et F_2 deux sous-espaces vectoriels de E . Montrer que $F_1^o + F_2^o = (F_1 \cap F_2)^o$ et $F_1^o \cap F_2^o = (F_1 + F_2)^o$.
2. En déduire que, si G_1 et G_2 sont des sous-espaces vectoriels de E^* , on a $G_1^o + G_2^o = (G_1 \cap G_2)^o$ et $G_1^o \cap G_2^o = (G_1 + G_2)^o$.
3. Dédire également de la première question que $F_1 \oplus F_2 = E$ si et seulement si $F_1^o \oplus F_2^o = E^*$.

Exercice 4. Soit $f: E \rightarrow F$ un morphisme entre espaces de dimensions finies.

1. Montrer que $\text{im}({}^t f) = \ker(f)^o$ et que $\ker({}^t f) = \text{im}(f)^o$.
2. En déduire que f est injective si et seulement si ${}^t f$ est surjective et que f est surjective si et seulement si ${}^t f$ est injective.

Exercice 5. Soient $f: E \rightarrow F$ un morphisme et V un sous-espace de E . Montrer que $f(V)^o = ({}^t f)^{-1}(V^o)$.